

Producto:

CEFASPUR

Antibiótico

Suspensión Inyectable

FICHA TÉCNICA

Composición:

Cada mL contiene:	
Ceftiofur clorhidrato	50 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Presentaciones:

Frasco x 20 mL
Frasco x 100 mL



Indicaciones:

Para el control y tratamiento de enfermedades ocasionadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas causantes de la pasteurelosis, pleuroneumonía, colibacilosis, salmonelosis, pododermatitis y enfermedades respiratorias en bovinos, equinos, porcinos y caninos, incluso vacas en producción. Aduvante en casos de mastitis y metritis.

Especies y Dosis:



Bovinos: 1 - 2 mL por cada 50 kg

Porcinos: 1 mL por cada 15 kg a 17 kg

Equinos: 2 - 4 mL por cada 50 kg

Caninos: 0,2 mL por cada 5 kg

Repetir cada 24 horas durante 3 a 5 días.

Registros:



Ecuador Reg. No. 2C1-8699-AGROCALIDAD
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 005042/12
Venezuela Reg. No. INSAI2041PI33N075820
Guatemala MAGA No. EC432-07-01-3032
Perú Reg. SENASA No. F.83.42.I.0036
Paraguay Reg. SENACSA No. 18.564
Costa Rica Reg. M.A.G #MV-6808
Panamá: RF-9075-21

Aplicación:

Vía Intramuscular profunda, en caninos aplicar por vía subcutánea.

Advertencias:



Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Abierto el frasco no guarde mas de 15 días. En caso de producirse reacciones alérgicas aplique antihistamínicos o epinefrina.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,
Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.

Quito - Ecuador

PBX: (593-2) 399-7000

www.jamesbrownpharma.com

Periodo de Retiro:

Carne: 2 días.

Leche: No deja residuos.



Uso Veterinario