

**PRODUCTO:**

**IVERMEC - JB**

Antiparasitario Endectocida.  
Solución Inyectable.

**PARA ESPECIES:**



**DESCRIPCIÓN:**

Macrólido de acción prolongada, utilizado en el control de parásitos en los animales.

**COMPOSICIÓN:**

**Contiene:**

Ivermectina

**INDICACIONES:**

Para el control de parásitos gastrointestinales, pulmonares redondos y ectoparásitos como gusano de monte (nuche), piojos y ácaros de las sarnas. En el control de garrapatas (*Boophilus microplus*) actúa inhibiendo la ovoposición y eclosión de los huevos.

**DOSIS:**

Bovinos, Ovinos y Camélidos: 1 ml por cada 50 Kg de peso.  
Porcinos: 1 ml por cada 33 Kg de peso.

1 ml	50 kg --- 110 lb	(peso vivo)	6 ml	300 kg --- 660 lb	(peso vivo)
2 ml	100 kg --- 220 lb	(peso vivo)	7 ml	350 kg --- 770 lb	(peso vivo)
3 ml	150 kg --- 330 lb	(peso vivo)	8 ml	400 kg --- 880 lb	(peso vivo)
4 ml	200 kg --- 440 lb	(peso vivo)	9 ml	450 kg --- 990 lb	(peso vivo)
5 ml	250 kg --- 550 lb	(peso vivo)	10 ml	500 kg --- 1100 lb	(peso vivo)

**ADVERTENCIAS:**

- No aplique en animales débiles, convalecientes o desnutridos.
- En caso de presentarse reacciones alérgicas, use epinefrina o antihistamínicos.
- **Tiempo de Retiro:** Carne bovinos, ovinos y camélidos: 28 días antes del sacrificio.  
Porcinos: 21 días antes del sacrificio.
- No aplicar en vacas en lactancia, ni 28 días antes del parto.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- Eliminar los envases en lugares autorizados.
- Evite la contaminación del agua, tóxico para peces y otras especies acuáticas.
- **Mantener fuera del alcance de los niños.**
- Venta con prescripción Médico Veterinaria.

**REGISTROS:**

Ecuador Reg. No.3A1-3B1-2-3-9411-AGROCALIDAD  
Panamá:RF-2577-13  
Perú Reg. SENASA No.F.54.42.I.0102  
Venezuela:M.I.6.653

Bolivia Reg. SENASAG PUV-F No. 005552/13  
Guatemala MAGA No. EC432-104-01-3556



**PRESENTACIÓN:**

- Frasco x 10 ml
- Frasco x 50 ml
- Frasco x 100 ml
- Frasco x 250 ml
- Frasco x 500 ml

**APLICACIÓN:**

Vía subcutanea.

Uso veterinario.

