

PRODUCTO:

SULFAVIT
Antibiótico
Polvo Soluble.

PARA ESPECIES:



DESCRIPCIÓN:

Combinación de antibiótico más vitaminas, para el tratamiento de la coccidiosis y otras enfermedades bacterianas.

COMPOSICIÓN:

Contiene:

Sulfadimetoxina Sódica
Vitamina A
Vitamina K

INDICACIONES:

La sulfadimetoxina está indicada para el control y tratamiento de la coccidiosis e infecciones bacterianas en aves, terneros, porcinos, ovinos, caprinos y conejos. La vitamina A actúa regenerando epitelios y la vitamina K es un coadyuvante de la coagulación en las hemorragias. SULFAVIT se disuelve en el agua, tiene baja toxicidad y no incide en el desarrollo y postura de las aves.

DOSIS:

Terneros, cabras y ovejas:	2 g x 10 kg de peso, en alimento o agua de bebida.
Cerdos y conejos:	3 - 6 g x 1 kg de alimento.
Pavos:	1 g x litro de agua.
Pollos:	2 g x litro de agua
Gallinas:	4 g x litro de agua

Todo tratamiento debe durar 6 días seguidos.

ADVERTENCIAS:

- No administrar en pollos de más de 16 semanas.
- Una vez preparada la solución o mezcla, deberá utilizarse dentro de las siguientes 12 horas.
- No guarde sobrantes.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y humedad.
- **Tiempo de Retiro:** Carne de aves y conejos: 5 días; otras especies: 7 días.
- Eliminar los envases en lugares autorizados.
- **Mantener fuera del alcance de los niños.**
- Venta con prescripción Médico Veterinaria.

REGISTROS:

Ecuador Reg. No..2B1-1664-AGROCALIDAD
Panamá:RF-3826-07
Guatemala MAGA No. EC432-07-01-3028

Paraguay Reg. SENACSA No. 12.674
Costa Rica Reg. M.A.G #EC4-42-18-3862



PRESENTACIÓN:

Sobres x 20 g (caja x 50)
Pomo x 100 g
Balde x 2.5 kg

ADMINISTRACIÓN:

En aves, se administra en el agua de bebida. En el período de tratamiento no puede darse de beber agua de otras fuentes. En cerdos, terneros y otras especies, puede administrarse en el alimento o disuelto en agua.

Uso veterinario.

