# FICHA TÉCNICA



# RPR®VET 100 mg

#### Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético

Tabletas

# Composición:

Cada tableta de 2 gramos contiene:		
Carprofeno 100 mg		
Excipientes c.s.p.	2 g	

# <u>Presentaciones:</u>

Frasco x 50 tabletas.

## **Indicaciones:**

Sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas, hacen de este AINE el tratamiento ideal para el manejo y alivio del dolor, generado por procedimientos quirúrgicos y sucesos traumáticos en caninos.

Su posible especificidad inhibitoria sobre la ciclooxigenasa-2 (COX 2), la fosfolipasa A2 y la síntesis de prostaglandinas, permiten su administración por largos periodos sin los consecuentes efectos secundarios de otros antiinflamatorios no esteroideos; dicho efecto, facilita el control del dolor crónico, asociado a la enfermedad articular degenerativa (osteoartritis), la displasia de cadera o de codo y la enfermedad del disco intervertebral, entre otras.

Uso Veterinario.

#### **Especies v Dosis:**

Peso Corporal	Dosis Principio Activo	Dosis Producto
22,7 kg	2,2 mg	½ tableta cada 12 h
	4,4 mg	1 tableta cada 24 h
45,5 kg	2,2 mg	1 tableta cada 12 h
	4,4 mg	2 tabletas cada 24 h

# Registro:

Ecuador Reg. No. RIP-FAR-137



## Administración:

Vía oral, directamente en la boca del animal, administrar por 5 a 7 días o a criterio del Médico Veterinario.

# Advertencias y Contraindicaciones:

- Contraindicado en pacientes con trastornos hematológicos (anemia hemolítica), deshidratación, hipovolemia, hipotensión, hembras gestantes, cachorros menores de 6 semanas, hipersensibilidad al fármaco.
- Usar con precaución en animales geriátricos y en aquellos que presenten afecciones crónicas preexistentes como: Enfermedad intestinal inflamatoria, insuficiencia renal o hepática.
- Su administración puede generar desde efectos digestivos leves, hasta daño hepático, renal o hematológico.
- De presentarse signos gastrointestinales, suspender la terapia si esto persiste por más de 1 a 2 días.
- Dosis superiores a las recomendadas, puede provocar hipoalbuminemia y melena.
- Evite su administración junto a productos que irriten el tubo gastrointestinal o con glucocorticoides, aminoglucósidos u otros AINES.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

#### ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.

Quito - Ecuador PBX: (593-2) 399-7000

LÍNEA ESPECIES MENORES







