



Antiinflamatorios

Indicaciones:

Sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas, hacen de este AINE el tratamiento ideal para el manejo y alivio del dolor, generado por procedimientos quirúrgicos y sucesos traumáticos en caninos. Su posible especificidad inhibitoria sobre la ciclooxygenasa-2 (COX 2), la fosfolipasa A2 y la síntesis de prostaglandinas, permiten su administración por largos períodos, sin los consecuentes efectos secundarios de otros antiinflamatorios no esteroideos; dicho efecto, facilita el control del dolor crónico, asociado a la enfermedad articular degenerativa (osteoartritis), la displasia de cadera o de codo y la enfermedad del disco intervertebral, entre otras.

Composición:

Carprofeno	100 mg
Excipientes c.s.p	2 g

Administración:

Vía oral, directamente en la boca del animal.

Dosis:

Administrar por 5 a 7 días o a criterio del Médico Veterinario.

Peso Corporal	Dosis Principio Activo	Dosis producto
22,7 kg	2,2 mg	½ tableta cada 12 h
	4,4 mg	1 tableta cada 24 h
45,5 kg	2,2 mg	1 tableta cada 12 h
	4,4 mg	2 tabletas cada 24 h

ELABORADO POR

JAMES BROWN PHARMA C.A.

Pifo. Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½.

PBX: +593 2 399 7000

Quito - Ecuador

www.jamesbrownpharma.com



Advertencias:

- Contraindicado en pacientes con trastornos hematológicos (anemia hemolítica), deshidratación, hipovolemia, hipotensión, hembras gestantes, cachorros menores de 6 semanas, hipersensibilidad al fármaco.
- Usar con precaución en animales geriátricos y en aquellos que presenten afecciones crónicas preexistentes como: Enfermedad intestinal inflamatoria, insuficiencia renal o hepática.
- Su administración puede generar desde efectos digestivos leves, hasta daño hepático, renal o hematológico.
- De presentarse signos gastrointestinales, suspender la terapia
- si esto persiste por más de 1 a 2 días.
- Dosis superiores a las recomendadas, puede provocar hipoalbuminemia y melena.
- Evite su administración junto a productos que irriten el tubo gastrointestinal o con glucocorticoides, aminoglucósidos u otros AINES.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta libre.

Uso Veterinario.

Presentación:

Frasco x 50 Tabletas

Registros:

Ecuador Reg. No. RIP-FAR-137

Guatemala MAGA No. MV-EC432-14-04-16593



Manejo y alivio del dolor.



Agradable sabor.



Conoce más en [f](#) [@](#) [d](#)

AyudaMascotas.ec



www.mascotas.ec