

## Ficha Técnica



### Antiparasitario Externo

#### Indicaciones:

Por la asociación de sus activos, actúa de forma eficaz en la prevención y tratamiento de infestaciones de varios tipos de ectoparásitos tales como pulgas, piojos y garrapatas en caninos. Su acción residual le permite actuar por un periodo de cuatro semanas aproximadamente.

Brinda protección indirecta contra la transmisión de Babesia canis, Anaplasma platys y Ehrlichia canis e infestaciones de Dipylidium caninum. Además, puede usarse como terapia de apoyo en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas.

#### Composición:

Cada mL contiene:

Imidacloprid	100 mg
Permetrina	500 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

#### Aplicación:

Tópica, colocar todo el contenido de la pipeta, separando el pelo desde la región de la nuca hasta la base de la cola.

#### Dosis:

Aplicar todo el contenido de la pipeta.

0.5 mL = Caninos de hasta 5 kg de peso vivo

En todos los casos se recomiendan dosis únicas y repetir los tratamientos en base a la prevalencia de los parásitos en el lugar, la posibilidad de reinfección o a criterio del Médico Veterinario.

#### Advertencias:

- El producto posee un amplio margen de seguridad y aplicado en la dosis, frecuencia y vía recomendada no genera efectos adversos.
- No aplicar en animales sensibles a los componentes del producto.
- No usar en felinos.
- No aplicar en cachorros menores de 7 semanas.
- Usar con precaución en hogares donde convivan caninos y felinos, particularmente cuando los gatos acicalen a los perros.
- Puede presentarse prurito e irritación local en el sitio de aplicación, pero es poco frecuente.
- La aplicación puede provocar alergia, hipersalivación o náuseas.
- Evitar el contacto con los ojos y mucosas, en el caso de ocurrir lavar con abundante agua.
- Consultar al Médico Veterinario antes de aplicar en animales geriátricos, gestantes o lactantes.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta Libre

#### Presentación:

Pipeta x 0.5 mL

#### Registro:

Ecuador Reg. No. RIP-FAR-399



Elimina garrapatas, pulgas, piojos y fases larvarias.



Repelente de moscas y mosquitos.



Conoce más en f @d

AyudaMascotas.ec



www.mascotas.ec

#### ELABORADO POR

JAMES BROWN PHARMA C.A.

Pfo. Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½.

PBX: +593 2 399 7000

Quito - Ecuador

[www.jamesbrownpharma.com](http://www.jamesbrownpharma.com)



## Ficha Técnica



### Antiparasitario Externo

#### Indicaciones:

Por la asociación de sus activos, actúa de forma eficaz en la prevención y tratamiento de infestaciones de varios tipos de ectoparásitos tales como pulgas, piojos y garrapatas en caninos. Su acción residual le permite actuar por un periodo de cuatro semanas aproximadamente.

Brinda protección indirecta contra la transmisión de Babesia canis, Anaplasma platys y Ehrlichia canis e infestaciones de Dipylidium caninum. Además, puede usarse como terapia de apoyo en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas.

#### Composición: Cada mL contiene:

Imidacloprid	100 mg
Permetrina	500 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

#### Aplicación:

Tópica, colocar todo el contenido de la pipeta, separando el pelo desde la región de la nuca hasta la base de la cola.

#### Dosis:

Aplicar todo el contenido de la pipeta.

1.5 mL = Caninos de 5 a 15 kg de peso vivo

En todos los casos se recomiendan dosis únicas y repetir los tratamientos en base a la prevalencia de los parásitos en el lugar, la posibilidad de reinfección o a criterio del Médico Veterinario.

#### Advertencias:

- ❖ El producto posee un amplio margen de seguridad y aplicado en la dosis, frecuencia y vía recomendada no genera efectos adversos.
- ❖ No aplicar en animales sensibles a los componentes del producto.
- ❖ No usar en felinos.
- ❖ No aplicar en cachorros menores de 7 semanas.
- ❖ Usar con precaución en hogares donde convivan caninos y felinos, particularmente cuando los gatos acicalen a los perros.
- ❖ Puede presentarse prurito e irritación local en el sitio de aplicación, pero es poco frecuente.
- ❖ La aplicación puede provocar alergia, hipersalivación o náuseas.
- ❖ Evitar el contacto con los ojos y mucosas, en el caso de ocurrir lavar con abundante agua.
- ❖ Consultar al Médico Veterinario antes de aplicar en animales geriátricos, gestantes o lactantes.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta Libre

#### Presentación:

Pipeta x 1.5 mL

#### Registro:

Ecuador Reg. No. RIP-FAR-399

#### ELABORADO POR

JAMES BROWN PHARMA C.A.

Pfo. Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½.

PBX: +593 2 399 7000

Quito - Ecuador

[www.jamesbrownpharma.com](http://www.jamesbrownpharma.com)



Elimina garrapatas, pulgas, piojos y fases larvarias.

Repelente de moscas y mosquitos.



Conoce más en [f](#) [@](#) [d](#)

[AyudaMascotas.ec](http://AyudaMascotas.ec)



[www.mascotas.ec](http://www.mascotas.ec)

## Ficha Técnica



### Antiparasitario Externo

#### Indicaciones:

Por la asociación de sus activos, actúa de forma eficaz en la prevención y tratamiento de infestaciones de varios tipos de ectoparásitos tales como pulgas, piojos y garrapatas en caninos. Su acción residual le permite actuar por un periodo de cuatro semanas aproximadamente.

Brinda protección indirecta contra la transmisión de Babesia canis, Anaplasma platys y Ehrlichia canis e infestaciones de Dipylidium caninum. Además, puede usarse como terapia de apoyo en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas.

#### Composición:

Cada mL contiene:

Imidacloprid	100 mg
Permetrina	500 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

#### Aplicación:

Tópica, colocar todo el contenido de la pipeta, separando el pelo desde la región de la nuca hasta la base de la cola.

#### Dosis:

Aplicar todo el contenido de la pipeta.

3 mL = Caninos de 15 a 30 kg de peso vivo

En todos los casos se recomiendan dosis únicas y repetir los tratamientos en base a la prevalencia de los parásitos en el lugar, la posibilidad de reinfección o a criterio del Médico Veterinario.

#### Advertencias:

- El producto posee un amplio margen de seguridad y aplicado en la dosis, frecuencia y vía recomendada no genera efectos adversos.
- No aplicar en animales sensibles a los componentes del producto.
- No usar en felinos.
- No aplicar en cachorros menores de 7 semanas.
- Usar con precaución en hogares donde convivan caninos y felinos, particularmente cuando los gatos acicalen a los perros.
- Puede presentarse prurito e irritación local en el sitio de aplicación, pero es poco frecuente.
- La aplicación puede provocar alergia, hipersalivación o náuseas.
- Evitar el contacto con los ojos y mucosas, en el caso de ocurrir lavar con abundante agua.
- Consultar al Médico Veterinario antes de aplicar en animales geriátricos, gestantes o lactantes.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta Libre

#### Presentación:

Pipeta x 3 mL

#### Registro:

Ecuador Reg. No. RIP-FAR-399



Conoce más en [f](#) [@](#) [d](#)

AyudaMascotas.ec



[www.mascotas.ec](http://www.mascotas.ec)

#### ELABORADO POR

JAMES BROWN PHARMA C.A.

Pifo. Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½.

PBX: +593 2 399 7000

Quito - Ecuador

[www.jamesbrownpharma.com](http://www.jamesbrownpharma.com)

