

Producto:

FLUVIPEN

Polvo + Diluyente (suspensión inyectable)

Antibiótico - Antiinflamatorio

Composición:

Cada mL contiene:	
Penicilina G Procaínica	200.000 U.I.
Dihidroestreptomicina	300 mg
Flumetasona	0.065 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Presentación:

Frasco x 20 mL



FICHA TÉCNICA

Indicaciones:

Para el tratamiento de las enfermedades causadas por bacterias susceptibles a las Penicilinas y Dihidroestreptomicina como: Mastitis, Metritis, Neumonías, Septicemias, Pododermatitis, Leptospirosis, tratamientos quirúrgicos post operatorios e involución uterina después del parto.

Especies y Dosis:



Bovinos - Equinos: 1 mL por 20 kg de peso.
Porcinos - Ovinos: 1 mL por 15 kg de peso.
Caninos: 1-2 mL por 5 kg de peso.
Felinos: 0,5-1 mL por 5 kg de peso.

Adminístrese de 3 a 5 días

Registros:



Ecuador Reg. No 2C1-3396-AGROCALIDAD
 Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 005551/13
 Guatemala MAGA No. EC432-07-01-6945
 Perú Reg. SENASA No. F.F6.13.I.0006
 Venezuela Reg. No. INSAI2041PI33N078242
 Panamá: RF-9073-21

Aplicación:

Vía Intramuscular profunda.
 Para reconstituir introduzca el diluyente en el frasco que contiene el polvo y agite hasta obtener una suspensión uniforme.

Advertencias:



En caso de reacciones alérgicas, aplique antihistamínicos o epinefrina.
 No aplicar en hembras en el último tercio de gestación, puede ocasionar abortos.
 Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

Periodo de Retiro:

Leche: 3 días
Carne: 28 días



ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,
 Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.
 Quito - Ecuador
 PBX: (593-2) 399-7000
 www.jamesbrownpharma.com



Uso Veterinario