

Producto:

FORTIPEN

Polvo + Diluyente (suspensión inyectable)

Antibiótico - Antiinflamatorio

Composición:

Cada mL contiene:		
Penicilina G Procaínica	150.000 U.I.	
Penicilina G Sódica	150.000 U.I.	
Estreptomicina	300 mg	
Diclofenaco Sódico	15 mg	
Excipientes c.s.p.	1 mL	

FICHA TÉCNICA

Presentación:

Frasco x 20 mL



Indicaciones:

Acción efectiva contra bacterias gram positivas y negativas causantes de neumonías, septicemias, panadizos, mastitis, actinomicosis y leptospirosis. También efectiva en infecciones del ombligo, castraciones y otras intervenciones quirúrgicas en bovinos, equinos, porcinos y ovinos.

Especies y Dosis:











1 mL por cada 20 kilos de peso

 Bovinos
 20 mL

 Equinos
 15 mL

 Novillos - Potros
 10 mL

 Terneros - Ovejas - Porcinos
 3-8 mL

Aplicar cada 12 horas por un máximo de 5 días o a criterio del Médico Veterinario.

Registros:



Ecuador Reg. No. 2C4-8800-AGROCALIDAD Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 005550/13 Guatemala MAGA No. EC432-07-01-11775 Venezuela Reg. No. INSAI2041PI33N077948 Perú Reg. SENASA No. F.03.13.I.1336

Panamá: RF-3830-22

Aplicación:

Vía intramuscular profunda.

Para reconstituir introduzca el diluyente en el frasco que contiene el polvo y agite hasta obtener una suspensión uniforme.

Periodo de Retiro:

Carne: 28 días Leche: 3 días

Advertencias:



En caso de producirse reacciones alérgicas aplique antihistamínicos o epinefrina.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo. Quito - Ecuador PBX: (593-2) 399-7000 www.jamesbrownpharma.com



Uso Veterinario