

Producto:

OXITER 200 L.A.

Solución Inyectable
Antibiótico de amplio espectro

Composición:

Cada mL contiene:	
Oxitetraciclina base	226.5 mg
Flunixin meglumine	10 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Presentaciones:

Frasco x 20 mL
Frasco x 100 mL
Frasco x 250 mL



Indicaciones:

Antibiótico de amplio espectro más antiinflamatorio no esterooidal, para el tratamiento de infecciones por gérmenes Gram positivos y negativos causantes de la pasteurellosis, metritis, colibacilosis, salmonelosis, anaplasmosis, pododermatitis, difteria y neumonías en bovinos, porcinos y equinos.

Especies y Dosis:



Bovinos - Equinos: 1 mL por cada 20 kg.
Porcinos: 0.5 a 1 mL por cada 10 kg de peso.
Repetir el tratamiento a las 48 horas.

Registros:



Ecuador Reg. No.: 2C1-8A4-11699-AGROCALIDAD
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 005553/13
Guatemala MAGA. No. MV-EC432-07-01-3027
Perú Reg. SENASA No. F.71.01.I.0080
Panamá: MV-8092

Aplicación:

Vía intramuscular profunda, intravenosa lenta con solución dextrosada, en lavados uterinos diluidos en agua destilada.

Periodo de Retiro:

Carne: 28 días

Leche: No administrar a vacas en producción de leche destinada al consumo humano

Advertencias:



La aplicación intramuscular en bovinos en algunos casos puede causar irritación y un cierto grado de necrosis, por lo que en esta especie debe preferirse la vía intravenosa.

No administrar a hembras gestantes, no usar en caso de daño renal o hepático severo.

No aplicar en equinos en entrenamiento en los 8 días previos a la carrera.

No administrar junto con penicilinas, antiácidos, hierro y calcio.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,
Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.
Quito - Ecuador
PBX: (593-2) 399-7000
www.jamesbrownpharma.com



Uso Veterinario